

ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹	تعداد صفحه: ۳	سوالات امتحان نهایی درس: هندسه ۳
نام و نام خانوادگی:	مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	رشته: ریاضی فیزیک	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی) مجاز است.

۱	<p>جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.</p> <p>(الف) ماتریس مربعی که همه درایه های غیر واقع بر قطر اصلی آن صفر باشند را ماتریسگویند.</p> <p>(ب) مکان هندسی، مجموعه نقاطی از صفحه (یا فضا) است که همه آنها یک ویژگی..... داشته باشند و همچنین هر نقطه که آن ویژگی را داشته باشد عضو این مجموعه باشد.</p> <p>(پ) در حالتی که $\frac{c}{a} = 1$ بیضی به یک تبدیل می شود.</p> <p>(ت) بردار $\bar{k} = 2\bar{j} - \bar{a}$ در فضا سه بعدی بر صفحه مختصات سه بعدی منطبق است. (xoz , yoz, xoy)</p>	۱
۱	<p>درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.</p> <p>(الف) اگر A و B دو ماتریس 3×3 دلخواه باشند آنگاه عبارت $(A + B)^T = A^T + 2AB + B^T$ همواره برقرار است.</p> <p>(ب) اگر صفحه P به گونه ای باشد که هر دو تکه بالایی و پایینی سطح مخروطی را قطع کند و شامل محور باشد، در این صورت فصل مشترک صفحه P و سطح مخروطی یک هذلولی است.</p> <p>(پ) نقطه (۳,-۲) روی دایره $x^2 + y^2 + 2x = 0$ قرار دارد.</p> <p>(ت) برای سه بردار \bar{i} و \bar{j} و \bar{k} به طول های واحد روی محورهای مختصات در \mathbb{R}^3، داریم: $\bar{i} \times \bar{j} = \bar{k}$.</p>	۲
۱/۵	<p>اگر $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$، $A = \begin{bmatrix} 4 & a \\ b & -1 \end{bmatrix}$ ماتریس قطری باشد.</p> <p>باشد مقادیر a و b را طوری به دست آورید که حاصل ضرب $A \times B$ ماتریس</p>	۳
۱/۷۵	<p>دو ماتریس $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$، $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ در نظر بگیرید</p> <p>(الف) آیا جمع دو ماتریس A و B تعریف می شود؟ چرا؟</p> <p>(ب) حاصل $A \times B$ را به دست آورید.</p>	۴
۱	<p>ماتریس $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ مفروض است، ماتریس A را به دست آورید.</p>	۵
۱/۲۵	<p>مقدار m را طوری بیابید که دستگاه معادلات خطی $\begin{cases} 2x + my = 1 \\ (m-1)x + y = 3 \end{cases}$ جواب نداشته باشد.</p>	۶
۱/۵	<p>معادله دایره ای را بنویسید که مرکز آن بوده و روی خط به معادله $x + y = 2$ وتری به طول $2\sqrt{2}$ جدا کند.</p>	۷
	<p>ادامه سوالات در صفحه دوم»</p>	

ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹	تعداد صفحه: ۳	سوالات امتحان نهايی درس: هندسه ۳
نام و نام خانوادگی:	مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	رشته: رياضي فيزيك	پايه: دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مرکز سنجش و پايش كيفيت آموزشي http://aee.medu.ir			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۸	در نقطه A روی دایره $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 3$ مماسی بر آن رسم کرده‌ایم، معادله این خط مماس را به دست آورید.	۱
۹	در بيضي روبرو نقاط A', A دو سر قطر بزرگ و نقاط F', F کانون‌های بيضی هستند ثابت کنيد: $A'F' = AF$	۱/۲۵
۱۰	در بيضي مقابل، طول قطر کوچک $\frac{\sqrt{3}}{2}$ طول قطر بزرگ است. اندازه زاويه $F'BF$ را به دست آورید.	۱/۲۵
۱۱	سهمی به معادله $y^2 - 2y + 8x + 9 = 0$ را در نظر بگيريد: الف) مختصات راس، کانون و معادله خط هادی سهمی را به دست آورید. ب) نمودار سهمی را رسم کنيد.	۲
۱۲	نقطه A به طول ۲ روی محور X ها و نقطه B روی صفحه XOZ به طول ۱ و ارتفاع ۳ در فضای سه بعدی مفروض اند. الف) مختصات نقاط A و B را مشخص کنيد. ب) طول پاره خط AB را محاسبه کنيد. پ) مختصات وسط پاره خط AB را به دست آورید.	۲
۱۳	تصویر قائم بردar $\vec{a} = (2, -1, 2)$ را بر امتداد بردar $\vec{b} = (1, 0, -1)$ بیابید.	۱/۲۵
۱۴	بردارهای \vec{a} و \vec{b} به طول های ۳ و $2\sqrt{6}$ واندازه ضرب خارجي $ \vec{a} \times \vec{b} = 72$ مفروضاند. اگر زاويه بين دو بردار \vec{a} و \vec{b} کمتر از 90° باشد مقدار ضرب داخلی دو بردار را به دست آورید.	۱/۲۵
۱۵	مقدار m را طوري تعبيين کنيد که سه بردار $\vec{c} = (1, -2, 3)$, $\vec{b} = (0, m, -1)$, $\vec{a} = (2, -1, 3)$ در يك صفحه باشنند.	۱
	موفق و سر بلند باشيد .	۲۰ جمع نمره

مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۶/۲۹		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهریور ماه سال ۱۴۰۰	
نمره	راهنمای تصحیح		ردیف
۱	۷۳ ص	الف) قطری ($0/25$) ص ۱۲ ب) مشترک ($0/25$) ص ۴۹ ت) yoz ($0/25$) ص ۳۶ پ) پاره خط ($0/25$) ص ۴۹	۱
۱	۳۹ ص	الف) نادرست ($0/25$)	۲
	۸۱ ص	ب) نادرست ($0/25$)	
	ت) درست ($0/25$)	۴۲ ص	
۱/۵	$A \times B = \begin{bmatrix} ۴ & a \\ b & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ & -۲ \\ ۳ & ۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۴+۳a & -۸+۲a \\ b-۳ & -۲b-۲ \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} -۸+۲a = ۰ \\ b-۳ = ۰ \end{cases} \xrightarrow[\text{(. / ۵)}]{} \begin{cases} a = ۴ \\ b = ۳ \end{cases}$	۲۱ ص	۳
۱/۷۵	۱۳ ص	الف) خیر ($0/25$) - زیرا دو ماتریس هم مرتبه نیستند. ($0/5$)	۴
	۳۰ ص	$A \times B = \begin{bmatrix} -۳ & ۴ & -۲ \\ -۴ & ۶ & -۴ \\ -۸ & ۱۱ & -۶ \end{bmatrix} \quad A \times B = ۰ \quad (0/5)$	
۱	۲۳ ص	$A^{-1} = \begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ ۲ & ۳ \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{(. / ۲۵)}]{ A^{-1} = \lambda} \lambda, A = (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} ۳ & ۱ \\ -۲ & ۲ \end{bmatrix}$	۵
۱/۲۵	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'} \xrightarrow[\text{(. / ۲۵)}]{m-1} \frac{۲}{m-1} = \frac{m}{1} \neq \frac{۱}{۳} \xrightarrow[\text{(. / ۲۵)}]{m(m-1) = ۲} m(m-1) = ۲ \xrightarrow[\text{(. / ۲۵)}]{m=2 \text{ or } m=-1} \begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$	۲۶ ص	۶
۱/۵	۴۳ ص	از مرکز دایره بر وتر عمود می کنیم عمود OH و تر AB را نصف می کند. $OH = \frac{ x + y - 2 }{\sqrt{1+1}} = \frac{ 0+1-2 }{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ($0/5$) $OA^r = OH^r + AH^r \xrightarrow[\text{(. / ۵)}]{=} OA^r = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^r + \left(\sqrt{2} \right)^r = \frac{10}{4} = R^r$ $(x-o)^r + (y-1)^r = \frac{10}{4}$ ($0/25$)	۷
	«ادامه در صفحه دوم»		

مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۶/۲۹		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهریور ماه سال ۱۴۰۰	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۸	<p>مرکز دایره برابر است با $m_{AO} = \frac{3-1}{2-1} = 2$ (۰/۲۵) شیب خط عمود بر دایره در نقطه A(۲,۳) برابر است با: $m' = -\frac{1}{m_{OA}} = -\frac{1}{2}$ (۰/۲۵) شیب خط مماس بر دایره در نقطه A(۲,۳) قرینه و بر عکس شیب خط عمود است $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 2)$ (۰/۲۵) معادله خط مماس بر دایره برابر است با: (۰/۲۵)</p>	۱
۹	<p>نقطه A', A روی بیضی قرار دارند بنابر تعريف بیضی داریم $AF' + AF = 2a$ و $A'F' + AF = 2a$ (۰/۵) نتیجه $AF' + A'F = AF + AF'$ $\xrightarrow{(۰/۲۵)} A'F' + (A'F' + FF') = AF + (AF + FF')$ $\xrightarrow{(۰/۵)} AF = A'F'$ می گیریم:</p>	۱/۲۵
۱۰	<p>در مثلث BOF داریم: $\cos OBF = \frac{BO}{BF}$ $\xrightarrow{(۰/۲۵)} \cos OBF = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\xrightarrow{(۰/۲۵)} OBF = 30^\circ$ (۰/۲۵) $\longrightarrow F'BF = 2OBF = 60^\circ$ (۰/۲۵)</p>	۱/۲۵
۱۱	<p>(الف) $y^2 - 2y + 1 = -8x - 9 + 1 \longrightarrow (y-1)^2 = -8(x+1)$ $\xrightarrow{(۰/۵)} A = (-1, 1)$, $a = 2$ (۰/۵) $F(-3, 1)$ (۰/۲۵), $x = 1$ (۰/۲۵)</p> <p>ب) رسم سه‌می (۰/۵)</p>	۲
۱۲	<p>الف) $A = (2, 0, 0)$ (۰/۲۵), $B = (1, 0, 3)$ (۰/۲۵)</p> <p>ب) $AB = \sqrt{(2-1)^2 + (0-0)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{10}$ (۰/۲۵)</p> <p>پ) $M = \left(\underbrace{\frac{2+1}{2}, \frac{0+0}{2}, \frac{0+3}{2}}_{(۰/۵)}\right) = \left(\frac{3}{2}, 0, \frac{3}{2}\right)$ (۰/۲۵)</p> <p>ص ۶۶ و ۷۶</p>	۲
	«ادامه در صفحه سوم»	

مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۶/۲۹		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهریور ماه سال ۱۴۰۰	
نمره	راهنمای تصحیح		ردیف
۱/۲۵	$\vec{a} \cdot \vec{b} = ۲ \times ۱ + (-۱)(-۱) + ۲ \times ۰ = ۳ \quad (۰/۲۵)$, $ \vec{b} = \sqrt{۱^۲ + (-۱)^۲ + ۰^۲} = \sqrt{۲} \quad (۰/۲۵)$ $a' = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{b} ^۲} \vec{b} = \frac{۳}{۲}(1, -1, ۰) = \left(\frac{۳}{۲}, -\frac{۳}{۲}, ۰\right) \quad (۰/۲۵)$	۸۰ ص	۱۳
۱/۲۵	<p>روش اول:</p> $ \vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \sin \theta \xrightarrow{(۰/۲۵)} \sin \theta = \frac{۷۲}{۳ \times ۲۶} = \frac{۱۲}{۱۳} \quad (۰/۲۵) \longrightarrow \cos \theta = \pm \frac{۵}{۱۳} \quad (۰/۲۵)$ $\xrightarrow{۰<\theta<۹۰^\circ} \cos \theta = \frac{۵}{۱۳} \quad (۰/۲۵) \longrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \theta = ۳۰ \quad (۰/۲۵)$ <p>روش دوم:</p> $ \vec{a} \times \vec{b} ^۲ + (\vec{a} \cdot \vec{b})^۲ = \vec{a} ^۲ \vec{b} ^۲ \xrightarrow{(۰/۲۵)} ۷۲^۲ + (\vec{a} \cdot \vec{b})^۲ = ۳^۲ \times ۲۶^۲ \quad (۰/۲۵)$ $(\vec{a} \cdot \vec{b})^۲ = ۹۰۰ \xrightarrow{(۰/۲۵)} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \pm ۳۰ \xrightarrow{۰<\theta<۹۰^\circ} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = ۳۰ \quad (۰/۲۵)$	۸۴ ص	۱۴
۱	$\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{c}) = ۰ \xrightarrow{(۰/۲۵)} (۰, m, -1) \cdot ((۳, -۳, -۳)) = ۰$ $\xrightarrow{(۰/۲۵)} -۳m + ۳ = ۰ \xrightarrow{(۰/۲۵)} m = ۱ \quad (۰/۲۵)$	۸۲ ص	۱۵
۲۰	جمع نمره	موفق و سر بلند باشد	

"مصحح گرامی، به راه حل‌های درست و منطبق بر کتاب درسی بارم به تناسب منظور شود"